

ULUKIHOOLE



Ulukihoole

Ulukite elutingimuse, st varje-,
pesitsus- ja toitumisolude
parandamine
ehk
elupaikade mahutavuse
suurendamine.

Ulukihoole rikastab jahivõimalusi.



Kes vajavad hoolet?

- Jahiulukid, kes elutsevad oma leviala äärealadel ehk suhteliselt ebasoodsates tingimustes;
- Potentsiaalsed metsa- või põllukahjurid;
- Liigid, kes on inimese tegevuse tõttu ohustatud ja vajavad ellu jäämiseks inimese abi.



- Toidubaasi suurendamine;
- Looduslike vaenlaste arvukuse piiramine;
- Varje- ja pesitsustingimuste parendamine.



LISASÖÖTMINE

- Eelkõige talvine lisasöötmine;
- Kanalised, jänesed, metssiga, metskits, hirv, karu;
- Söödasõimed, -künad, -hoidlad, varjualused.



SÖÖDAPÕLDUDE RAJAMINE

- Ulukite paiknemise suunamine, et vähendada põllukahjustusi ja hõlbustada jahti;
- Jäetakse talvekuudeks koristamata, et pakkuda ka siis toidulisa;
- Raps, söödakapsas, rukis, kaer, maapirn, segatis, nisu, hernes.



HAABADE LANGETAMINE

- 4...5 puud korraga;
- Vähem korbastunud koorega, suurema võraga puud;
- Novembrist aprillini.



SOOLAKUTE RAJAMINE

- Ulukite naatriumivajaduse rahuldamiseks;
- Soolabriketid, mis sisaldavad ka muid ulukitele vajalikke mineraale;
- Enimkasutatav tulpsoolak;
- Söödasõimede lähedusse.



Looduslike vaenlaste arvukuse reguleerimine

- Väikekiskjate (eelkõige kährik, rebane, mink) küttimine;
- Vareste ja ronkade küttimine.



Elupaikade parendamine

- Pesitsuskohtade loomine, tehispesad;
- Veekogude taastamine;
- Põõsastike, metsatukkade, põllupeenarde säilitamine/ kujundamine.



Metskitsehoole

- Eelkõige talvine lisasöötmine ning metsateede ja –sihtide lumest puhastamine;
- Lisasööt peab sisaldama nii koresööta, mahlakat sööta kui jõusööta;
- Koresööt: hein (ristik, lutsern, leherikas metsahein) ja lehisvihad (nõges, paju, vaarikas, pihlakas);
- Mahlakas sööt: söödakapsas, -peet, kartul, maapirn, õunad;
- Jõusööt: kaer, muu teravili, tammetõrud;
- 1 sõimsöödahoidla ja 5...10 söodasõime 1000 ha kohta.



Metsseahoole

- Sobib igasugune teravili (mais), kartul, tammetõrud;
- Valguvajaduse rahuldamiseks kala- ja lihajäätmed;
- Sööt jaotada 150...200 m² suurusele alale;
- Kui sööta viiakse harvem kui üle päeva, rajada varjualune või kasutada söödaautomaati;
- Maisi jm teravilja võib anda pudelis, vaadis vm väikese avaga anumask.



- Eelkõige põtrade eemalemeelitamiseks metsakultuuridest;
- Soolakud;
- Pajustike tagasiniitmine.



Veelindude hoole

- Veekogude puhastamine, tiigikeste, kraavisoppide rajamine, õlgede toomine;
- Lisatoitmine sügisest alates lindude talvitumiseks või kevadine lisa söötmine kohapealse pesitsemise kindlustamiseks;
- Teravili (oder, nisu).



Kanaliste hoole

- Väikekiskjate kütmine;
- Söödapõldude rajamine;
- Varjete rajamine;
- Teravili (kaer, nisu) kas terade või vihkudena + kruus 1..8 mm kivikestega.

